

# De operatiepatiënt

## *Vorbereiding*

Elke eigenaar maakt zich zorgen als zijn huisdier onder narcose moet gebracht worden. Dat is normaal. Met deze informatie proberen we u dan ook zo goed als mogelijk te informeren over deze procedure.

- Het dier moet steeds **nuchter** zijn. Wat houdt dit in? Minimum twaalf uur voor de ingreep neemt u het eten weg !!! Water hoeft doorgaans niet weggenomen te worden.  
**Uitzondering** hierop zijn Knaagdieren: cavia, konijn... !!!! Omwille van hun specifieke maagdarmsysteem moeten zij tot vlak voor de ingreep beschikking hebben over eten en drinken
- Het dier dient uitgebreid de gelegenheid te krijgen om zijn behoefte te doen. Een hond moet uitgelaten worden vooraleer hij bij de dierenarts gebracht wordt.
- Een kat moet tijdens het vasten binnengehouden worden, waarbij de kattenbak regelmatig schoongemaakt wordt.

## *De narcose (anesthesie of verdooving)*

- Allereerst wordt premedicatie gegeven, hierdoor wordt uw dier wat rustiger.
- De verdooving zelf gebeurt door een injectie in de spieren of in een ader.
- Vervolgens wordt uw dier in slaap gehouden dmv gas.

Het doel van de verdooving is het pijngevoel en het bewustzijn uit te schakelen. In sommige gevallen zal uw dier tijdens de verdooving aan een infuus gehouden worden. Tijdens de narcose worden het hartritme en ademhaling continu gecontroleerd.

## *Nazorg na de operatieve ingreep:*

- De dag van de ingreep mag het dier niet eten. Dus moet u tot de volgende morgen wachten alvorens uw huisdier eten te verschaffen. Drinken daarentegen mogen ze vanaf ze goed wakker zijn. Dit steeds in kleine hoeveelheden aanbieden.
- !!! **Uitzondering** hierop zijn de knaagdieren!!! Hiervoor moet u zien dat u eten meebrengt, want zodra ze wakker zijn, moeten deze diertjes weer zo snel mogelijk eten.
- De dieren mogen naar huis zodra hun gezondheidstoestand dit toelaat. Als gevolg van de narcose treedt een daling in lichaamstemperatuur op. De ademhaling en circulatie worden eveneens beïnvloed. Bij het ontwaken is dan ook alle aandacht gevestigd op het herstel van die functies. Het ontwaken gebeurt daarom best in een warme, kleine omgeving, waar het dier zich niet

kan kwetsen. Van zodra het dier volledig wakker is, mag deze naar huis. Ze kunnen dan in hun vertrouwde omgeving herstellen. De dag van de operatie uw dier warm houden op een rustige plaats.

- Het dier mag zeker niet likken of bijten aan de wonde. Vaak is het nodig hiervoor een T-shirt/ body of kraag aan te doen.
- Meestal moeten hechtingen verwijderd worden. Dit gebeurt na 10 dagen. De genezing en de algemene toestand van de patiënt worden hierbij nog eens gecontroleerd. Het verwijderen van de hechtingen zit bij in de prijs inbegrepen. Dus daar hoeft u niet extra voor te betalen.
- Vaak worden er nog pijnstillers en/ of andere medicatie meegegeven. Volg hiervoor de instructies die u krijgt.
- Ondanks het feit dat het dier er vrij wakker uitziet, heeft hij nog niet al zijn reflexen terug. Daarom moet uw poes bijv. minstens twee tot drie dagen binnen houden. Het zou immers niet de eerste kat zijn die net na verdoving onder een auto loopt of een sprong met slechte afloop doet, omdat zijn reflexen nog niet de oude zijn.

### *Waarop moet u letten na een operatie:*

- Braken kort na de verdoving is mogelijk; dit mag echter geen dagen duren
- Nabloeden (een paar druppels) is normaal
- Bij gasanesthesie kan u dier nog een korte tijd hoesten door de tracheotube
- Overmatig zwellen van een wonde is abnormaal
- Overmatige productie van wondvocht is abnormaal